

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

שם התכשיר וצורתו: אקטונל חד שבועי ACTONEL ONCE A WEEK TABLETS

הרכב: כל טבליה מכילה Risedronate Sodium 35mg

חומרים בלתי פעילים:

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Magnesium stearate, Ferric oxide yellow E172, Ferric oxide red E172, Hypromellose, Macrogol 400, Hydroxypropyl cellulose, polyethylene glycol 8000, Silicon dioxide, Titanium dioxide E171.

פעילות רפואית: אקטונל 35 מ"ג מותווה לטיפול ומניעת אוסטאופורוזיס בנשים לאחר הפסקת המחזור החודשי

מתי אין להשתמש בתכשיר?

- אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מיניקה
- אין להשתמש בתרופה אם קיימים קשיי בליעה מסיבה כלשהי
- אין להשתמש בתרופה זו אם אינך יכולה להישאר במצב זקוף (ישיבה או עמידה) במשך 30 דקות לאחר נטילת התרופה.
- אין להשתמש בתרופה זו במצב של היפוקלצמיה (רמות נמוכות של סידן בדם) שטרם אוזנה.
- אין להשתמש בחולים עם כשל כיליתי חריף (ערכי פינוי קריאטינין מתחת ל- 30 מ"ל/דקה)
- אין להשתמש בתכשיר אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
- התכשיר מכיל לקטוז ולכן אין להשתמש אם הינך סובלת מגלקטוזמיה, בעיות בספיגת גלוקוז וגלקטוז או חוסר בלקטאז.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה, הוושט, מקשיי בליעה, אם קיים גורם המגביל אותך לשבת או לעמוד במצב זקוף.

אזהרות:

אם הינך רגישה/למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
יש לחכות לפחות 30 דקות בין נטילת אקטונל לבין נטילת תכשירים ומוצרי מזון אחרים (ראה סעיף מינון) התרופה יעילה רק אם היא נלקחת על קיבה ריקה.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: כאבי שרירים, עצמות או מפרקים, כאבי ראש, הפרעות במערכת העיכול כגון: כאבי בטן, שלשול, בחילה ועצירות דלקת בקשתית(בעיניים), רגישות יתר.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

כאבים בבית החזה, הופעת צרבת או החמרה של צרבת קיימת, קשיי בליעה או כיב בווושט רגישות ברירות המעי הדק, לשון, עיניים: (נדירות) הפסק הטיפול ופנה לרופא גירוי או פריחה בעור: (נדירות): המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!
בכל מקרה שבו הינך מרגישה/תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון:

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
יש ליטול טבליה אחת של אקטונל חד שבועי 35מ"ג פעם בשבוע עם כוס מלאה של מי ברז כדבר ראשון לאחר ההשכמה בבוקר, וזאת לפחות 30 דקות לפני ארוחת בוקר, לפני שתיית משקה כלשהו (פרט למי ברז), או לפני נטילת תרופה כלשהי.

- יש לקחת את הטבליה ביום קבוע בכל שבוע.

- אין לשכב 30 דקות לאחר נטילת התרופה.

- אין לעבור על המנה המומלצת

- תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

- יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.
- אם שכחת ליטול את התרופה בזמן שנקבע, יש ליטול טבליה מיד כשנזכרת ולהמשיך לקחת את הטבליה הבאה ביום הקבוע בשבוע שבו החל הטיפול. אין לקחת שתי טבליות באותו יום.
- בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להקפיד על תזונה עשירה בסידן ובויטמין D כגון מוצרי חלב.

אופן השימוש:

- אין ללעוס או למצוץ!
- לבלוע את התרופה עם כוס מלאה של מי ברז בלבד – ראה לעיל
- אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.
- אי-הקפדה על ההנחיות לנטילת התרופה עלולה להגביר את הסיכון לפגיעה בושט.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת, היא עלולה להזיק. אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

בטמפרטורת החדר.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 1268230595

יצרן: פרוקטור & גמבל, גרמניה
סוכן היצרן: אוונטיס פארמה בע"מ

כתובת: ת.ד. 8090, נתניה 42504

DRUGS-ABOUT.COM