



Patient leaflet according to pharmacists' regulations
(Preparations) - 1986

Read the entire leaflet carefully before commencing treatment:

Baby Gel Day / Baby Gel Night

Composition:

Baby Gel Day Care:
Each tube contains: Benzocaine 7.5%.
Inactive ingredients:
Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

Baby Gel Night Care:
Each tube contains: Benzocaine 10%.
Inactive ingredients:

Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

The medicine is intended for the relief of teething pain.

When should the product not be used?

Do not use if you are hypersensitive to any of its ingredients
This medicine should not be used without consulting your physician prior to commencing treatment in babies less than 4 months of age.

Warnings:

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your physician before commencing treatment.

Drug Interactions:

If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

Side Effects:

In addition to the desired effects of the medicine, some side effects may appear during treatment with this medicine.

Side effects requiring special attention:

If you experience irritation, rash or local infection (which did not exist before using this medicine) (rare): stop treatment and consult your doctor immediately.

If you notice side effects not mentioned in this leaflet, or if there has been a change in your general health, consult your physician immediately!

DRUGS - ABOUT . COM

Baby Gel Day & Night

1

4/21/05, 1:09 PM



תשרי המסתמך بموجب אישור רפואה

(מסתמרות) - 1986

אור/י השימוש בקטלוג ובאמצעות קבלת אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה / בטיי ג'ל ללילה

התרכיב:

בטיי ג'ל ללילה:

Benzocaine 7.5%

הרכיבים הנותרים:

Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

בטיי ג'ל ללילה:

Benzocaine 10%

הרכיבים הנותרים:

Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

האזהרה: להחליף בכאבים הנגרמים מעמידת שיניים.

מתי ניתן לשימוש: להחליף כאבים חסיניים לאחר מדידת הרופא.

יש להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ללילה: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

עליו לצרכן לפי תקנות הרופאים (התשרים)

קרא/י בעיון את העליו עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה:

בטיי ג'ל ליום / בטיי ג'ל ללילה

הרכיב:

בטיי ג'ל ליום:

Benzocaine 7.5%

הרכיבים הנותרים:

Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

בטיי ג'ל ללילה:

Benzocaine 10%

Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Sorbitol, Sorbic Acid, Flavor (Berry), Sodium Saccharin, FD&C Red #40.

האזהרה: להחליף בכאבים הנגרמים מעמידת שיניים.

מתי ניתן לשימוש: להחליף כאבים חסיניים לאחר מדידת הרופא.

יש להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ליום: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ליום: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ליום: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ליום: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.

בטיי ג'ל ליום: אין להשתמש במוצר לפני שיתקבל אישור הרופא.





Side Effects in children and infants:
Parents should inform the physician if side effects occur, or if any other medications are being taken by the child/infant!

See above for side effects mentioned specifically.

Dosage:
Usual dosage unless otherwise specified by the physician: apply to the gums with a clean finger, up to 4 times daily.

Do not exceed the recommended dose.
This medicine is usually not intended for children and infants below 4 months of age.

If there is no improvement in your condition within a week, refer to the physician.

Attention: Do not swallow!

This medicine is intended for external use only.
Instructions for Use: Apply to the gums using a clean finger.

Avoid Poisoning!

This medicine and all other medicines must be stored in a safe place, out of reach of children and/or infants to avoid poisoning.

If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to the hospital emergency room and bring the package of medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: In a cool place.

Even if stored according to its recommended instructions, medicines have a limited shelf life. Pay attention to the expiry date of the product. If in doubt, consult the dispensing pharmacist. Different medicines should not be stored in the same container.

Registration numbers:

Baby Gel Day: 108 02 28203

Baby Gel Night: 123 84 30332

Manufacturer: Medibrands Ltd., P.O.Box 531, Yokneam 20692.

The format of this leaflet has been determined by the Ministry of Health and its content has been examined and approved.

1 0910405

Baby Gel Day & Night



זמן, או אם חל שינוי בהתגברות הכללית, עלול להתרועע עם תרופת מיד.

תופעות לוואי בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה מסתתרת הניתנת לילד/הן/הן, לעיל תופעות לוואי שפורטו.

מניין:

מינון מקובל בתעודת הוראה אחרת מרופא: למורחה על התוכנית בעודת אצבע בקלי, עד 4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מועדפת בדרך-כלל לילדים ותינוקות מותרת לגל 4 חודשים.

אם חל שיפור במצב תוך שבוע, יש לפנות לרופא.

אם לא, לא לבלוע, תרופה זו מועדפת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש: למריחה על התיכיים בעודת אצבע בקלי.

מני הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כר תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחוד מיון של בית חולים ולהבא ארזות התרופה איתך.

אין לזרם להקטן ללא הוראה מפורשת מרופא!

אזלסטל תרופות בתוספת
יש לחדק החותית וממנו בכל פעם שחידך נוסל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך חוקיק/ה לזהם.

אחסנה: במקום קריר.

גם לפני תמאי האריזה/ אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. לא לשים צל לתאריך התפוגה של התכשיר בכל מקרה של ספק, עלול להיוועץ בהקדמת שסיפק לך את התרופה. אין ללחסן תרופות שונות באותה ארזות.

מס' רישום התרופה:

108 02 28203 יום: 20692

בימי 71 לילה: 123 84 30332

יצרן: מריברנד בע"מ, תד 531, יוקנעם 20692.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר.

