

Patient package insert in accordance with the Pharmacists' Regulations (preparations) – 1986
The dispensing of this medicine requires a doctors prescription
Read the entire leaflet carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was determined by Ministry of Health and its content was checked and approved.

Dilantin Suspension

Composition:

Each 5 ml suspension contains 125 mg Phenytoin.

Indication: Antiepileptic drug.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.
Do not use this medicine if you are breastfeeding.

Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment:

If you are pregnant, because this medicine may harm the fetus. If you were exposed to this medicine during pregnancy, especially in the first trimester, you should consult with one of teratological centers for assessment of the risk of harming the fetus. Do not use this medicine without consulting a physician before starting treatment if you are suffering from porphyria, if you are suffering or have suffered in the past, from impaired function of the heart and vascular system, the liver, the kidney/urinary tract, the blood system (e.g. coagulation disorder), diabetes.

How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may impair alertness and therefore caution should be exercised when engaging in activities such as driving a car, operating dangerous machinery and in any other activity which requires alertness.
Children should be cautioned against engaging in activities such as bicycle riding, playing near roads and the like.

Do not drink wine or alcoholic beverages while under treatment with this medicine.

While treated with this medicine pay attention to the teeth hygiene to avoid gum problems.

Warnings:

During treatment with this medicine, the following tests should be performed: blood, hepatic function, electroencephalogram (EEG), and hydantoin concentrations in the serum.

If you are sensitive to any type of food or medicine, especially to hydantoin anticonvulsants, inform your physician that you are taking this medicine.

Before any kind of surgery (including dental surgery) inform your physician that you are taking this medicine.

Attention: This medicine may affect serum levels and laboratory test results of PBI test (protein-bound iodine), dexamethasone, metyrapone, alkaline phosphatase, glucose, GGt, calcium and sugar.

Drug Interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising

belonging to the following groups: drug affecting the central nervous system (e.g. sedatives (such as: chlordiazepoxide, diazepam, disulfiram, methylphenidate, trazodone, viloxazine), anesthetics (such as: halothane) antidepressants (such as: tricyclics, fluoxetine, fluvoxamine, sertraline, clozapine, paroxetine, antihistamines), antimodrone.

Antibacterial drugs: chloramphenicol, sulfonamides, rifampin, erythromycin, isoniazid, ciprofloxacin, doxycycline, praziquantel, and tetracycline.

Antifungal drugs: fluconazole, ketokonazole, miconazole, amphotericin B, itraconazole, azoles.

Anticancer drugs: cimetidine, sucralfate, and omeprazole. Xanthines: aminophylline, theophylline.

Anticoagulants, Other antiepileptic and anticonvulsant drugs (felbamate, succinimide, vigabatrin, carbamazepine, barbiturates, valproic acid, sodium valproate, lamotrigine).

Hormones: Estrogens, corticosteroids.

Hypoglycemic drugs: tolbutamide, diazoxine, chlorpropamide, glyburide.

Analgesic and anti-inflammatory drugs: azapropazone, phenylbutazone, salicylates.

Cardiovascular agents and drugs treating hypertension: amiodarone, dicumarol, diltiazem, nifedipine, ticlopidine, reserpine, digitoxin, nocardipine, nimodipine, quinidine, verapamil.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) – ١٩٨٦
هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب
اقرأ/ئي النشرة بكاملها وباطلاع قبل استعمال المستحضر
حدّدت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وفحصت مضمونها وأقرّتها.

ديلانتين شراب

تركيب المادة الفعالة:

تحتوي كل ٥ ملتر من الشراب Phenytoin 125 mg

الفعالية الطبية: علاج مرض الصرع.

متى يُمنع استعمال المستحضر؟

يُمنع الاستعمال إذا كانت هناك حساسية لأحد مركّبات الدواء.
لا تستعجلي الدواء إذا كنت مرضعة.

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت حاملاً، لأن هذا المستحضر قد يسبب ضرراً للجنين. إذا تعرّضت لهذا الدواء خلال فترة الحمل، وخصوصاً في الثلث الأول منها، فعليك استشارة أحد المراكز لبحث المسوخ والتشوهات لتقييم الخطر لإصابة الجنين.

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني/ين من مرض البرفيرية (خلل في أبيض الغروفرين)، إذا كنت تعاني/ين أو إذا عانيت سابقاً، من خلل في وظيفة القلب والأوعية الدموية، الكبد، الكلية/جهاز البول، نظام الدم (التخثّر)، مرض السكري.

كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟

قد يضعف استعمال هذا الدواء اليقظة ولذلك يجب التزام الحذر عند سيطرة السيارة، وعند تشغيل الآلات الخطرة وأثناء أي عمل يتطلب اليقظة.
بالنسبة للأولاد يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة أو اللعب على مقربة من الشارع الخ.

يُمنع شرب الخمر أو المشروبات الروحية في فترة العلاج بهذا الدواء.
يجب الاعتناء بصحة الفم خلال فترة العلاج بالدواء، وذلك من أجل منع المشاكل باللثتين.

تحذيرات: في فترة العلاج بهذا الدواء عليك إجراء فحوص للدم، لوظائف الكبد، مخطط الدماغ الكهربائي ومستويات الفينيتوين في الدم.

إذا كانت لديك أية حساسية معروفة لنوع معين من الطعام أو العقاقير، وبصورة خاصة لمضادات التخثرات من فصيلة الهيبتوثين، فعليك إعلام طبيبك عنها قبل تناول الدواء.

عليك إعلام الطبيب عن تناولك لهذا الدواء قبل أية عملية جراحية (بما فيها تلك المنطقتة بالأسنان) أو أي علاج طبي.

يرجى الانتباه: قد يؤثر هذا الدواء على مستوى مصل الدم ونتائج الفحوص المختبرية للـPBI (اليود المربوط بالبروتين)، للدوكساميتازون، ميثراپون، الكالين فوسفاتاز، غلوكوز، GGt، كلسيوم وسكر.

تفاعلات مع العقاقير الأخرى:

إذا كنت تتعاطى/ تتعاطين دواء آخر، أو انتهيت مؤخراً من تعاطي دواء آخر، فعليك إعلام الطبيب المعالج، لتقادي الأخطار وعدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين العقاقير. وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأدوية من الفصائل الآتية: أدوية تؤثر على جهاز الأعصاب المركزي [مثل: الأدوية المهدئة (مثل كلوروديأزيبوكسيد، ديازيبام، ديسولفيرام، ميثيلفنيدات، ترازودون، فيلوكسازين)، للتخدير (مثل هلوثنان)، أدوية ضد الكتابة (مثل تريسيكلات، فلوكسكازين، فلوفوكسامين، سرترالين، كلوزابين، پاروكسيتين، أدوية مضادة للسهامين]:

أدوية مضادة للبكتيريا (كلورامفينيكول)، سولفوناميدات، ريفامبين، أريتروميستين، إيزونيازيد، سيبروفلوكساسين، دوكسيسيتيلين، پرازيكوانتل، تتراسيكلين:

أدوية مضادة للفطر: فلوكونازول، كيتوكونازول، ميكونازول أمفوتريستين بي، إتراكونازول، آزولس:

أدوية لعلاج قرحة المعدة: سيمتيدين، سكرالقات، أومپرازول:

أدوية من فصيلة الكسانتينات: أمينوفيلين وتينوفيلين:

أدوية ضد تخثر الدم، أدوية أخرى لعلاج الصرع والتشنجات (فلبامات، سوكسينيميد، فيجابترين، كاربامازين، بريبتورات، حامض فالپروتيك، صوديوم فلپروثيت، لاموتريجين):

هورمونات (استروجين، كورتيكوستيروئيدات):

أدوية لعلاج السكري (تولبوتاميد، ديازوكسين، كلورپروپاميد، جليبيريد):

أدوية مضادة للالتهابات ولعلاج الآلام (إزايروپايونفغنيوتازونو ساليكسيلات):

أدوية لعلاج ضغط الدم العالي وللقلب (أميودارون، ديكومارول، ديلتيازيم، نيفيديين، تيكلوپيدين، ريزرپين، ديجيتوكسين، نيكروديين، نيموديين، كينيدين، فيراپاميل):

علون لآزرکن לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
פורמט על זה נקבע על־י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

דילנטין 125 תרחיף

הרכב החומר הפעיל:

כל 5 מ"ל תרחיף מכילים Phenytoin 125 mg

פעילות רפואית:

טיפול במחלת הנפילה (אפילפסיה).

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אל תשתמיש בתרופה אם הינך מיניקה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול:

אם הינך בהריון, היות ותכשיר זה עלול לגרום נזק לעובר. אם נחשפת לתרופה זו במהלך ההריון, במיוחד בשליש הראשון, עליך להיוועץ עם אחד ממרכזי הייעוץ הטרוטולוגיים, לשם הערכת הסיכון לפגיעה בעובר.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם הינך סובלת/ת ממחלת הפורפיריה, אם הינך סובלת/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: חלב וולני יום, הכבד, הכליה / מערכת השתן, מערכת הדם (קשישה), סכרת.

אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות.
באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אין לשתות יין: או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה. בתקופת הטיפול בתרופה יש להקפיד על היגיינת הפה כדי למנוע בעיות בחניכיים.

אזהרות:

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, תפקודי כבד, אלקטרואנצפילוגרם (EEG), רמות פניטואין בדם.

אם הנך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד לנוגדי עוויות מקבוצת ההידנטואין, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

לפני כל ניתוח (כולל דנטלי) או טיפול רפואי עליך להודיע לרופא על נטילת תרופה זו.

שים לב: תרופה זו יכולה להשפיע על תוצאות הרמות בדם ובדיקות מעבדה של PBI (יוד הקשור לחלבון), דקסטזון, מטירפון, פוספט אלקילי, גלוקוז, GGt, סידן וסוכר.

תגובות בין תרופתיות:

אם הנך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה (כגון: כלורודיאזפוקסיד, דיאזפם, דיסולפראם, מיתלפנידאט, טראזודון, וילוקסאזין), להרדמה (כגון: הלואן), תרופות נגד דיכאון (כגון: טריציקלים, פלואוקסטיין, פלובוקסאמין, סרטלין, קלזופין, פארוקסטיין), תרופות אנטי היסטמיניות.

תרופות אנטיביוטיאליות: כלורמפניקול, סולפונאמידים, ריפאמפי, אריתרומיצין, איזוניאזיד, ציפרופלוקסאסין, דוקסיציקלין, פראזיקוואנטל, טטראציקלין.

תרופות אנטי פיטרייתיות: פלוקוזול, קטוקוזול, מיקוזול, אמפוטריצין B, איטראקונזול, אזולים.

תרופות לטיפול בכיב קיבה: סימטידין, סוקרופט, אומפרזול.

תרופות מקבוצת הקסנטינים: אמנופילין ותאופילין.

תרופות נגד קרישת דם, תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה ובעוויות (פלמאט, סוקסינימיד, יוגטרין, קרבמפין, ברביטורטי, חומצה ולפרואית, סודיום ולפראט, למטררג'ין).

תרופות אנטיסטרואידים: קורטיקוסטרואידים.

תרופות לטיפול בסכרת: טולבטאמיד, דיאזוקסין, כלורופרופאמיד, גליבוריד.

תרופות אנטי דלקתיות ולטיפול בכאב: אזאפרופון, פנילבטוזון, סליצילטים.

תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ולב: אמיוודורן, דיקמרול, דילטיאזם, נפידין, טיקלופידין, רספינ, דיריטוקסין, ניקרדיפין, ניומיפין, קווינידין, ווראפמיל.

תרופות משתנות: פורוסמיד.

תרופות להרפיית שרירים: אלקורוניום, פנקורוניום, וקורוניום. תרופות אחרות: ציקלוספורין, מטאדון, ויטמין D ותוספי תזונה. אין ליטול או להפסיק לקחת תרופה אחרת מבלי להיוועץ ברופא. השימוש בתרופה זו עלול לגרום מעילותה של הגלולה למניעת הרייון לכן יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף או אחר.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: עצירות, סחרחורת, נמנום קל.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

בלבול, עצבנות קלה, נודי שינה, כאב ראש, הפרעות בדיבור או בקואורדינציה, תחושת נמלול, ירידה בלחץ דם, בחילה, הקאה, חום, עלייה בעוויות, רעד, חולשת שרירים או כאב, כאבים במפרקים, דימום מהחניכיים, נפיחות של השפתיים פריחה בעור עם גירויים, כאב גרון - המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!

קשיי נשימה עד אובדן הכרה (דווח בזמן בחזרקה או במינון יתר): הפסק את הטיפול ופנה לרופא מיד, בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ת תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון:

המינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור את המנה המומלצת.

שים/י לבי:

יש להמתין פרק זמן של ששתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סוּתרי חומצת המכילים סידן, תכשירים אחרים המכילים סידן ומולינדרן הידרוכלוריד.

אופן השימוש:

יש ליטול התרופה עם הארוחה.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא. הפחתת המינון תעשה בד"כ באופן הדרגתי. יתכן והרופא יבקש ממך לשאת כרטיס זהו רפואי הקובע שהינך נוטל/ת תרופה זו.

מוע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור היטב מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה י/ מייד לחדר מינון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תיתנו/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחושיך בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.

הרכיב/י משקפיים אם הנך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום חשוך בטמפרטורה מתחת ל- 30°C.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברופא שיספק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה:

1237024017

יצור: פארק דייוויס, ארה"ב

עבור: פארק דייוויס, ישראל בע"מ, רח' שנקר 9,

הרצליה פיתוח 46725.

אדوية مدرة للبول (فوروسמיד):

أدوية لإرخاء العضلات (الكورونيوم, פנקורוניום, ויקורוניום):

أدوية أخرى: سيكلوسبورين, ميتادون, فيتامين دي وإضافات غذائية.

يُمنع تناول أو إيقاف تناول دواء آخر بدون استشارة الطبيب.

قد يخفّض استعمال هذا الدواء من نجاعة الحيات لمنع الحمل ولذلك يجب استعمال وسائل منع أخرى أو إضافية.

الأعراض الجانبية:

بالإضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء, قد تظهر أثناء استعماله الأعراض الجانبية مثل: إمساك, دوام, نعاس خفيف.

أعراض تتركز الانتباه الخاص:

بليلة, عصبية خفيفة, آرق, آلام الرأس, اضطرابات في التكلم أو التناسق الحركي, شعور بالتمل, انخفاض مستوى ضغط الدم, غثيان, تقيؤ, سخونة, زيادة التشنجات, ارتجاف, ضعف العضلات أو آلام, آلام في المفاصل, إدماء من اللثتين, انتفاخ الشفتين, طفح جلدي مع تهيّج, ألم في الحلق - واصل/ي العلاج وتوجه/ي إلى الطبيب فوراً!

صعوبات في التنفّس حتى الإغماء (هناك تقرير عن ذلك بعد حقن أو تناول جرعة زائدة): توقّف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب فوراً!

في أية حالة تشعر/ين بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة, أو إذا حدث تغيير في شعورك العام, عليك استشارة الطبيب فوراً.

أعراض جانبية وتفاعلات بين عقاقير لدى الأطفال والرضع:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن أي عرض جانبي يظهر لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناولونه!

الجرعة:

حسب تعليمات الطبيب فقط. ممنوع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يُرجى الانتباه:

يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقلّ بين تناول هذا الدواء وتناول مضادات الحموضة التي تحوي كالسيوم, ومستحضرات أخرى تحوي كالسيوم وموليندرون هيدروكلوريد.

طريقة الاستعمال:

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

كيف بإمكانك أن تساعد/ي في نجاح العلاج؟

يجب استيفاء العلاج الموصى به من قبل الطبيب بكامله. يمنع التوقف عن تناول هذا الدواء حتى عندما يطرأ التحسّن على حالتك الصحية, بدون استشارة الطبيب.

يتمّ تقليص الجرعة عادةً بصورة تدريجية.

قد يطلب منك الطبيب حمل بطاقة تمييز طبية تدلّ على تناولك لهذا الدواء.

إمّنع/ي التسمّم!

يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق, بعيداً عن متناول أيدي أطفال و/أو رضع لمنع إصابتهم بتسمّم.

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد سهواً هذا الدواء, يجب مراجعة غرفة طوارئ المستشفى ومعك عبوة الدواء.

يُمنع تسبّب التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت وقد يضرّ مريضاً آخر. يُمنع إعطاء هذا الدواء لأقربائك, جيرانتك, أو معارفك.

يُمنع تناول أدوية في الظلام! يجب فحص رقة الدواء والجرعة قبل كل استعمال له. استعمال/ي النظارات إذا كنت بحاجة إليها.

التخزين: في مكان مظلم تقلّ درجة حرارته عن 30 مئوية.

حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة/التخزين الموصى بها, فإن الأدوية لا تبقى صالحة لمدة طويلة. يرجى الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء! في أية حالة من الشك عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. يُمنع حفظ أدوية مختلفة في نفس الوعاء.

رقم تسجيل الدواء: ١٢٣٧٠٢٤٠١٧

المنتج: پارک دیویس, الولايات المتحدة.

من أجل: فايزر فارماسوتیکالس اسرائیل م.ض., شارع شنکار 9,

هرتسليا پیتوواح 4725.

Diuretics: furosemide.

Neuromuscular blocking agents: alcuronium, pancuronium, vecuronium.

Other drugs: cyclosporines, metadone, vitamin D and nutritional supplements.

Do not take or stop taking another kind of medicine without consulting your physician.

Use of this drug may decrease the effect of oral contraceptive, therefore you should use a different or additional means of birth control.

Side Effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: constipation, dizziness, mild drowsiness.

Effects that require special attention:

Confusion, mild nervousness, insomnia, headache, speech or coordination disorders, tingling sensation, hypotension, nausea, vomiting, fever, increase in convulsions, tremor, muscle weakness or pain, bleeding of the gums, articulations pain, swelling lips, skin rash with itching, sore throat: continue treatment and refer to your physician immediately.

Respiratory distress up to lose of concouisness (reported with injectable administration or overdose): discontinue treatment and refer to your physician immediately.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your physician immediately.

Adverse reactions and drug interactions in children and infants:

Parents must inform the attending doctor about any side effect, as well as any additional medicine being taken by the child.

Dosage:

Dosage is according to physician's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage.

Attention:

Allow a lapse of at least two hours between taking this medicine and taking antacids that include calcium, other preparations that include calcium and molindone hydrochloride.

Directions for use:

Take the medicine with food.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine before consulting your physician. Your physician may want you to reduce gradually the amount you are taking before stopping completely. Your physician may want you to carry a medical identification card stating that you are taking this medicine.

Avoid Poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a physician!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm.

Do not give this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine.

Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a dark place below 30°C

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

License number: 1237024017

Manufacturer: Parke-Davis, USA.

For: Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd., 9 Shenkar St.,

Herzlya Pituach 46725.

DRUGS-ABOUT.COM