

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

MICETAL DERMAL CREAM

מיסטל קרם לעור

הרכב החומר הפעיל וריכוזו: Flutrimazole 1%

DRUGS-ABOUT.COM

פעילות רפואית: לטיפול נגד פטרת בעור.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך מניקה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: הרגשת צריבה או עקצוץ בעור באזור המריחה, גירוד בעור באזור המריחה או אדמומיות באזור המריחה. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

במידה וישנה הרגשת גירוי חזקה בעור או רגישות יתר באזור המריחה (נדיר): הפסק הטיפול ופנה לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון:

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא – למבוגרים ולילדים מעל גיל 10.
מרח מיסטל קרם פעם אחת ביום. יש למרוח כמות מספקת של הקרם על האזור המבוקש ומסביבו. עסה את הקרם כדי להאיץ את ספיגתו בעור. לטיפול בין האצבעות בידיים וברגליים, מתחת לחזה או מפשעה, עדיף למרוח כמות קטנה של הקרם, לפני השינה או בלילה כדי למנוע ריכוך יתר או מסמוס של העור. משך הטיפול נע בין שבוע ועד ארבע שבועות. יש להקפיד למרוח את מיסטל קרם לעור למשך מספר ימים נוספים גם לאחר העלמת הסימנים של הפטריה על העור.
אם לאחר 4 שבועות של טיפול רצוף לא הוטב המצב – מומלץ לפנות לרופא להתייעצות.
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 10.
יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים רקמות ריריות (כגון בפה ובאף).

אופן השימוש:

הסבר על הטיפול בפטריות: לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרחוץ האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול במשחה – ניתן להשתמש באבקת טלק או אבקה נגד פטריות כדי ליבש את המקום.
לטיפול ברגליים: יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש במיוחד בין הבהונות. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר.

כיצד תוכלי/י לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא.

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרס להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

במקום קריר. סגור את מכסה השפורפרת עם סיום השימוש.
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה : 12510.30417

יצרן : יוראיך בע"מ, ספרד.

יבואן : ג'נמדיקס בע"מ, ת.ד. 8500, נתניה 42504.

DRUGS-ABOUT.COM

עדכון אחרון : 27/03/02