

Synchron Sponge veterinary/91913/Renewal of Registration/Insert-Label



לשימוש וטרינרי בלבד
For veterinary use only

ספוגית סינכרון וטרינרי – Synchron Sponge veterinary

20 ספוגיות – 20 Sponges

סינכרון הינה ספוגית המכילה מדרוקסיפרוגסטרון אצטאט ומשמשת לבקרת מחזור הייחום בכבשים. החדרת הספוגית לוגינה לקבוצה גדולה של כבשים, למשך 14-12 יום, ומייד עם ההוצאה טיפול בסרום-גונדוטרופין, מבטיחה שיעור התעברות גבוה, שפירושו ריכוז מירב ההמלטות בתקופה הרצויה למגדל. יש לטפל בסינכרון במשולב עם סינכרוג'קט (PMSG) מייד עם הוצאת הספוגית מהוגינה.

תכולה: כל ספוגית מכילה 60 מ"ג מדרוקסיפרוגסטרון אצטאט.

התוויות: לבקרת מחזור הייחום וריכוז ייחומים בעדרי צאן.

הוראות השימוש: יש לטפל ברחלות בוגרות ושהגיעו לבשלות מינית ובמצב בריאות תקין. התקן את הספוגית במקום המיועד על המשום (אפליקטור), כך שחוט הניילון יהיה משוחרר. החדר את הספוגית לוגינה באמצעות המשום, ושחרר אותה בתוך הוגינה באופן כזה שחוט הניילון ישאר בחלקו מחוץ לוגינה. וודא שהספוגית מונחת היטב בעומק הוגינה. השאר את הספוגית בוגינה 14 – 12 יום. לאחר מכן, הוצא את הספוגית ע"י משיכה איטית בחוט הניילון שנותר מחוץ לוגינה. וודא שהספוגית הוצאה מהוגינה בשלמות. מייד עם הוצאת הספוגית מהוגינה יש להזריק לכבשה סרום-גונדוטרופין (סינכרוג'קט) במינון של 600 יב"ל PMSG. 58 – 48 שעות לאחר ההזרקה של PMSG יש להזריע את הכבשים או להרביע אותן.

התוויות נגד: אין לטפל ברחלות עם דלקות הנרתיק או מערכת המין או שטרם הגיעו לבשלות מינית, מצב גופני ירוד ובעתות הכבדה ו/או מחלה.

הערות: א. שמור במקום אפל וקריר **הרחק מילדים**.

ב. אין לטפל בסינכרון אלא בתאום ועל-פי הוראות הרופא הוטרינרי המטפל.

ג. יש להשמיד את הספוגיות מייד לאחר גמר הטיפול.

ד. מומלץ שהמטפל יחבוש כפפות על ידיו וימנע ממגע עורו עם הספוגית.

חייב מרשם רופא וטרינרי.

מיוצר ע"י וטימקס, הולנד.

סוכנים בלעדיים: פדרמן ובניו (אחזקות) בע"מ

הפצה ושיווק: אלון כימיקלים בע"מ