

פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו 05.06
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

DRUGS-ABOUT.COM

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה:

שם התכשיר וצורתו: טריכלונם אליקסיר Triclonam Elixir

הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם וריכוזם:

כל כפית (5 מ"ל) מכילה: Triclofos Sodium 500mg
 וכן מכילה כ- 2.7 גרם סוכרוז וכ- 50 מ"ג נתרן (סודיום).

חומרים בלתי פעילים:

Sucrose, Ethanol 95%, Sodium Hydroxide, Orange Oil 926, Lemon Oil,
 Vanillaroma 200, Saccharin Sodium, Nipastat, Disodium Edetate, Hydrochloride
 acid 37%, Sodium Carbonate, Sunset Yellow, Purified Water

פעילות רפואית: תכשיר המיועד לטיפול בחוסר שינה, להרגעה במצבים של מתח
 וחרדה ולפני ביצוע בדיקות רפואיות שונות.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
 אין להשתמש אם קיים ליקוי בכבד, לב או אם הנך סובל/ת מדלקת הקיבה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מניקה.
 אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה/מערכת השתן,
 מערכת העיכול (כגון אולקוס), מהפרעות נפשיות, מתלות באלכוהול, בסמים או בתרופות.

אך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך ?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות
 מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים יש להזהרם מרכיבה על אופניים או
 ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות:

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח
 לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי
 תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות
 להרגעה, לאלרגיה, לשינה, לפרקינסון, לאפילפסיה, חומרים מרדימים לניתוחים, משככי כאבים
 נרקוטיים), תרופות נגד קרישת דם מסוג קומרין, מעכבי מונואמין אוקסידז (לדיכאון). אלכוהול
 עלול להגביר את השפעת הטרילונם.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי. בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל כל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון לפי הוראות הרופא בלבד

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

סיוע לשינה:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 10 מ"ל, במקרים מסויימים יתכן וידרש מינון גבוה יותר – עד 20 מ"ל.

ילדים בגיל 6-12 שנים: 5-10 מ"ל ליום

ילדים בגיל 1-5 שנים: 2.5-5 מ"ל ליום

תינוקות עד גיל שנה: 1-2.5 מ"ל ליום

להרגעה:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 5 מ"ל פעמיים ביום.

ילדים בגיל 6-12 שנים: 5 מ"ל.

ילדים בגיל 1-5 שנים: 2.5 מ"ל.

תינוקות עד גיל שנה: 1 מ"ל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שים/י לב:

יש להקפיד על מדידת המנה בכפית מידה או בכוסית מדידה מיוחדת, מזלף וכו'.

מנע הרעלה !

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל יד כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך בחולה אחר (ת), היא עלולה להזיק. אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופה בחושך ! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל התרופה.

הרכבי/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר.
גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מ.ס. רשום התרופה: 479223600

יצרן: כ.צ.ט. תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי
משוק: כ.צ.ט. בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון

DRUGS-ABOUT.COM