

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

Tzarevet X Mint Flavour	צרבת X בטעם מנטה	שם התכשיר וצורתו:
Tzarevet X Melon Flavour	צרבת X בטעם מלון	
Tzarevet X Lemon Flavour	צרבת X בטעם לימון	
Tzarevet X Cherry Flavour	צרבת X בטעם דובדבן	

הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם וריכוזם:

Calcium Carbonate 500mg

(200 מ"ג סידן זמין לטבליה).

Tzarevet X - Mint Flavour chewable tablets

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

כמו כן כל טבליה מכילה כ – 7 מג' אספרטם

Tzarevet X - Melon Flavour chewable tablets

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

כמו כן כל טבליה מכילה כ – 4.5 מג' אספרטם

Tzarevet X - Lemon Flavour chewable tablets :

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Lemon flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104,

כמו כן כל טבליה מכילה כ – 3.5 מג' אספרטם

Tzarevet X - Cherry Flavour chewable tablets :

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Cherry flavour, FD&C Red No.40, FD&C Blue No.1 Lake

כמו כן כל טבליה מכילה כ – 6 מג' אספרטם

כומר סתירת חומצה לטבליה 10 mEq

פעילות רפואית: נוגד חומציות ותוספת קלציום (סידן) לתזונה.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
אין להשתמש אם הינך סובל/ת מעודף סידן, אבנים בכליות או סרקואידוזיס, אין להשתמש
במקרים של כאבי בטן והקאות.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
אם הינך בהריון או מניקה
אם הינך סובל/ת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה/מערכת השתן, במיוחד
אבנים בכליות.

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בצורה מופרזת בתקופת הטיפול עם התרופה
יש להימנע מעישון מופרז.

יש להימנע משתיה מופרזת של משקאות המכילים קפאין.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות רמת סידן בדם.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת
התרופה.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח
לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי
תרופות מהקבוצות הבאות:
תרופות המכילות קלציום, פוספט, מגנזיום, דיגיטליס (ללב), קורטיקוסטרואידים,
סטרציקלינים(אנטיביוטיקה), פנוטיאזין (לעויתות), ויטמין D.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי
עם קבלת התרופה, כאשר הנך מרגישה בשינוי במצב בריאותיך או בהרגשתך הכללית.
כגון: עצירות
בכל מקרה שבו הנך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך
הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

אין לעבור על המנה המומלצת

להקלת צרבת:**מבוגרים וקשישים :**

לעס/י או המס/י בפה 1-2 טבליות עם הופעת הצרבת.
 אין לצרוך למעלה מ – 15 ועדיף לא יותר מ - 11 טבליות בתקופה של 24 שעות
 אין להשתמש במינון המקסימלי יותר משבועיים.

ילדים 6-12:

לעס/י או המס/י בפה 1 טבליה עם הופעת הצרבת.
 אין לצרוך יותר מ- 4 טבליות בתקופה של 24 שעות.

כתוספת סידן:

ילדים, מבוגרים, נשים הרות ומניקות: 4 טבליות ליום.
נשים לאחר תקופת הבלות: 5 טבליות ליום.
 תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל 6.

יש ליטול את התרופה שעה עד שעה וחצי אחרי הארוחה.
 אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים יש לפנות לרופא.

שים לב:

אין ליטול תרופה זו בו זמנית עם חלב ומוצריו, תרד, רוברבר, סובין, מוצרי דגן.
 יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן
 דרך הפה כולל תכשירי ברזל הניתנים דרך הפה.

אופן השימוש:

אין לחצות או לכתוש את הטבליה

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל
 יד כך תמנע הרעלה.
 אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים,
 והבא אריזת התרופה איתך.
אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל התרופה.
 הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר

גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים
 לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את
 התרופה.
 אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

DRUGS-ABOUT.COM

מס. רשום התרופה
צרבת X בטעם מנטה מס. רשום: 1311430847
צרבת X בטעם מלון מס. רשום: 1311730850
צרבת X בטעם לימון מס. רשום: 131530848
צרבת X בטעם דובדבן מס. רשום: 1311630849

יצרן: כ.צ.ט תעשיות כימיות בע"מ, הקידמה 3 קרית מלאכי
משווק: כ.צ.ט. בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון